



Assessorato Agricoltura

“DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

UOD Fitosanitario regionale-UOD Servizio territoriale provinciale di Salerno”

BOLLETTINO FITOSANITARIO AREALE SELE/TANAGRO
(Comuni di Pontecagnano, Eboli, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio, Altavilla, Albanella, Serre, Postiglione, Controne, Sicignano degli Alburni, Buccino, Campagna, Colliano, Contursi Terme, Oliveto Citra, Palomonte, Ricigliano, San Gregorio Magno e Valva)

Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa delle piante
N. 06 del 27/03/2024

Andamento meteorologico

Andamento meteorologico dal 18/03/2024 al 24/03/2024 I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito http://agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo_2024.html

Stato fitosanitario delle colture

COLTURA: PESCO

N°	COMUNE	UTM	Varietà	Stadio fenologico	Stato Fitosanitario
		Località			
01	Eboli	Piano Dell'Ospedale	Platy Belle	Fioritura	Nulla da segnalare

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA.

Si consiglia di iniziare a monitorare la presenza di: **Bolla** o **Accartocciamento fogliare** (*Taphrina deformans*) Nei pescheti con un basso livello di rischio di infezione, un primo intervento alla caduta di almeno l'80% delle foglie ed un secondo a fine inverno o posticipato nella fase di gemma rigonfia-bottoni rosa.

Negli impianti colpiti l'anno precedente in forma grave o in caso di andamento meteorologico freddo e piovoso effettuare un primo intervento alla caduta di almeno l'80% delle foglie, un secondo verso fine inverno ed un terzo nella fase di gemma rigonfia-bottoni rosa, Ziram (1)(7); Dodina(3); Difenconazolo (2)(4); Tebuconazolo + zolfo (2)(5); Prodotti rameici (6); Captano (7)

- 1) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo interventi al bruno.
- (2) Con gli IBE al massimo 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.
- (3) Al massimo 2 interventi all'anno.
- (4) Il difenoconazolo non può essere complessivamente usato più di 2 volte all'anno.
- (5) Il tebuconazolo non può essere complessivamente usato più di 2 volte all'anno..
- (6) Non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno
- (7) Tra Ziram e Captano al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Solo interventi al bruno.

Non effettuare trattamenti



COLTURA: OLIVO

N°	COMUNE	UTM	Varietà	Stadio fenologico	Stato Fitosanitario
		Località			
01	Campagna	Santa Maria la Nova	Rotondella-Carpellese	Ripresa vegetativa	Nulla da segnalare

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

In questa fase fenologica si consiglia di iniziare a monitorare la presenza di:

In questa fase fenologica si consiglia di effettuare il campionamento della **Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae)**, prelevando a caso 100 foglie, dalla parte bassa della chioma, su 5-10 piante ogni 100 della coltivazione.

Si ricorda di eseguire la potatura in periodi asciutti, limitando i grossi tagli ed eliminando i rami infetti da Rogna. Inoltre, si consiglia di favorire l'arieggiamento e l'insolazione delle parti interne della chioma al fine di contenere gli attacchi di **Occhio di pavone, Lebbra e Cocciniglie**

COLTURA:ACTINIDIA

N°	COMUNE	UTM	Varietà	Stadio fenologico	Stato Fitosanitario
		Località			
01	Eboli	Pennatone	Hayward	Ingrossamento gemme	Nulla da segnalare
02	Battipaglia	Porta di Ferro	Hayward	Ingrossamento gemme	Nulla da segnalare

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

In questa fase fenologica si consiglia di iniziare a monitorare la presenza di: **Cancro batterico** (*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*)

Agronomico: Effettuare concimazioni equilibrate. Effettuare una potatura che consenta un buon arieggiamento della chioma. Effettuare la disinfezione degli attrezzi da taglio con sali di ammonio quaternari. Disinfettare le superfici di taglio e ricoprirle con mastici protettivi. Evitare irrigazioni per aspersione. Monitorare frequentemente gli impianti.



Con **Decreto Dirigenziale n.22 del 02/03/2023** sono state **approvate** le nuove **Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture** (valide per l'anno 2023 – pubblicate sul BURC della Regione Campania n° 20 del 13/03/2023).

Si informa che con **Decreto Dirigenziale n.74 del 12/05/2023** sono state modificate ed integrate le **Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture** (valide per l'anno 2023 – pubblicate sul BURC della Regione Campania n° 39 del 22/05/2023).

Le Norme costituiscono parte integrante e sostanziale dei disciplinari di Produzione Integrata della Regione Campania per la parte riguardante la difesa ed il diserbo integrato delle colture. A tali Norme Tecniche devono attenersi:

- le aziende agricole che aderiscono al Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI);
- i beneficiari della Misura 10 "Pagamenti Agro- climatici ambientali"– Sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali. Tipologia di intervento 10.1.1 "Produzione integrata" del PSR Campania 2014-2020 in quanto parte integrante e sostanziale dei disciplinari di produzione integrata per quanto riguarda la parte inerente la difesa e il diserbo integrato delle colture;
- tutti coloro che attuano la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture in Campania.

Le "Norme tecniche di difesa fitosanitaria integrata ed il diserbo integrato delle colture" sono parte integrante dei disciplinari di produzione integrata della Regione Campania e ad esse devono attenersi inoltre tutti coloro che attuano la produzione integrata in Campania per quanto attiene la parte della difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture.

Deroga territoriale per l'utilizzo della **s.a. Napropamide** per il diserbo in pre – semina di **broccoletti di rapa, cime di rapa, friarielli, Brassica juncea, cavolo verza, cavolo di Bruxelles, ravanello, rucola, crescione, valerianella e basilico** per il controllo di infestanti mono e dicotiledoni. **Prot. 224.0134166 del 13/03/2024**

Deroga territoriale per l'utilizzo della **s.a. Bifenazate** su **fragola** in pieno campo e in serra per il controllo del Ragnetto rosso (*T.urticae*) **Prot. 224. 0156395 del 26/03/202**

E' possibile, altresì, consultare tutte le deroghe territoriali , sul sito della **Regione Campania – Assessorato Agricoltura – Servizio Fitosanitario Regionale** <http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/disciplinari.html> . Sezione Deroghe Territoriali

Il presente Bollettino è stato redatto a cura del tecnico: Vincenzo Sica della **UOD Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti**” Ufficio di Battipaglia Via Belvedere, 4 - tel 0828/670720.

e-mail: cesa.eboli@regione.campania.it

Il prossimo bollettino sarà disponibile il **03/04/2024**